



### 1 HEPATITIS B

Es vacunarà als **2, 4 i 11 mesos** amb la vacuna hexavalent.

En noutats de mare amb AgHBs positiu o no vacunades en les quals no s'ha realitzat cribratge, s'administrarà una dosi de vacuna contra HB juntament amb una dosi d'immunoglobulina anti-HB en les **primeres 24 hores** de vida.

Captació activa a persones no vacunades.

### 2 DIFTÈRIA, TÈTAN, TOS FERINA

Una dosi de vacuna dTpa en cada embaràs. Preferentment, en la **setmana 27-28**.

Vacunació als **2, 4 i 11 mesos** amb vacuna hexavalent, com a primovacunació i reforç en el primer any de vida.

Vacunació als **5-6 anys** amb DTPa/VPI als nascuts a partir de 2017.

Vacunar amb Td als **14 anys**.

Verificar l'estat de vacunació previ abans d'iniciar o completar primovacunació en persones adultes. S'aprofitarà el contacte amb el sistema sanitari per a revisar l'estat de vacunació i, en cas necessari, es vacunarà amb Td fins a completar 5 dosis.

S'administrarà una dosi de Td entorn dels **65 anys** a les persones que van rebre 5 dosis, almenys, durant la infància i adolescència.

### 3 POLIOMIELITIS

Als **5-6 anys**, vacuna combinada DTPa/VPI als nascuts a partir de 2017 per a completar la vacunació contra la poliomielitis amb una quarta dosi.

### 4 MALATIA NEUMOCÒCCICA

La vacunació infantil es farà d'acord amb la pauta que s'arregla en la fitxa tècnica de la vacuna utilitzada als **2, 4 i 11 mesos** o als **2, 4, 6 i 11 mesos**.

En els majors a partir dels **65 anys**, segons protocol i la seua prioritació.

### 5 MALATIA MENINGOCÒCCICA

Vacunació als **2 mesos** (MenB), **4 i 12 mesos** (MenB i MenC).

Als **12 anys** (MenACWY) i després dels **12 anys** captació activa fins als **18 anys**.

### 6 PÀL·LOLA, RUBÈOLA, PAROTIDITIS

S'aprofitarà qualsevol contacte amb els serveis sanitaris per a revisar l'estat de vacunació.

Recomanar en persones sense vacunació documentada nascudes a Espanya a partir de 1978.

Contraindicada en embarassades i persones immunodeprimides.

### 7 VARICEL·LA

Rescat de manera activa en persones que no referisquen antecedents d'haver passat la malaltia i no s'hagen vacunat, administrar 2 dosis amb un interval mínim de 4 setmanes.

Als **12 anys** s'ha de comprovar que s'han rebut 2 dosis de vacuna. Si només tenen 1 dosi, cal completar amb una 2a dosi si no s'ha passat la malaltia.

Persones de **18 o més anys** sense evidència d'immunitat, cal fer serologia i, si és negativa, 2 dosis amb interval mínim de 4 setmanes.

Contraindicada en embarassades i persones immunodeprimides.

### 10 ROTAVIRUS

Cal administrar 2 dosis (RV1 2-4 mesos) o 3 dosis (RV5 2-4-6 mesos) d'acord amb la pauta que arregla la fitxa tècnica de la vacuna utilitzada respectant l'edat màxima de vacunació segons la fitxa tècnica del preparat vacunal utilitzat.

### 11 VIRUS RESPIRATORI SINCICIAL

Nounats entre l'1 d'abril i el 31 de març i lactants menors de 6 mesos durant la temporada de circulació del virus.

Xiquets i xiquetes de risc fins als **2 anys**. Prematurs de menys de 35 setmanes fins als 12 mesos.

### 8 VIRUS DEL PAPILOMA HUMÀ

Vacunació als **12 anys** xiquets i xiquetes, amb rescat als adolescents barons no vacunats nascuts a partir de l'any 2010.

### 12 COVID-19

En l'embaràs, en qualsevol trimestre.

Es recomana 1 dosi en la campanya estacional a les persones a partir dels **60 anys**.

### 9 GRIP

En l'embaràs, en qualsevol trimestre. Entre els 6 i 59 mesos, 1 dosi en temporada de grip. A partir de 60 i més anys, 1 dosi en temporada.

### 13 HERPES ZÒSTER

Dos cohorts per any als **65 i 80 anys**. Dos dosis: **0-2 mesos**.